

Nader gebruik lichaamsmateriaal

Lichaamsmateriaal wordt afgenomen voor diagnostische en therapeutische doeleinden. Lichaamsmateriaal dat na analyse overblijft kan voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden. Dit gebeurt op anonieme wijze, d.w.z. dat er niet meer kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is.

Indien er van uw kant bezwaren zijn tegen nader gebruik van uw lichaamsmateriaal, dan kunt u dit melden. De etiketten op de afnamebuizen worden dan voorzien van de tekst: Niet voor andere doeleinden gebruiken. Bezwaar hoeft maar één keer gemaakt te worden. Bij alle volgende aanvragen komt de tekst automatisch op de etiketten.

Opmerkingen + aandachtspunten voorzijde

Algemeen

1. MRSA sneltest (MRSA PCR + MRSA kweek) bij klinisch patiënten / patiënten die via de SEH worden opgenomen met MRSA verdenking. Anders alleen i.o.m. arts-microbioloog.
2. Een aanvraag op MRSA-PCR gaat altijd vergezeld met een MRSA-kweek.
3. In geval van opname in een buitenlandse zorginstelling of verblijf vluchtelingen opvang <2 mnd. geleden, wordt automatisch een CPB-, VRE-, MRGNS- en C.auris kweek verricht. Hierbij dienen keel-, neus-, rectum- én oksel/lies uitstrijk afgenomen te worden.

Aandachtspunten voorzijde

Vermeld op alle materialen naam + geboortedatum en afname locatie

- 1) Keeluitstrijk + neusuitstrijk + rectum uitstrijk. Indien van toepassing oksel/lies, (alle) wonden, sputum, urine (CAD), stoma.
- 2) Keeluitstrijk + neusuitstrijk.
- 3) In geval van MRSA-PCR eerst keel-, neus-, rectum met de PCR wattenstok (wit) afnemen. Vervolgens met de COPAN ESwab (roze dop) keel-, neus-, rectum afnemen. Indien van toepassing oksel/lies, (alle wonden), sputum, urine (CAD), stoma. Zie ook algemeen punt 3.
- 4) Rectum- of fecesuitstrijk (op wattenstok).
- 5) Rectumuitstrijk (i.c.m. MRSA-PCR (zie opmerking 3)). Overige materialen in overleg met de arts-microbioloog.
- 6) Oksel/lies swab is alleen voor candida auris kweek.

Wijze van afname

Neusuitstrijk

De binnenzijde van beide neusvleugels worden uitgestreken met dezelfde wattenstok.

Keel

Beide tonsillen (of indien de tonsillen zijn verwijderd de tonsilbogen) worden uitgestreken met dezelfde wattenstok.

Rectum

Het rectum wordt uitgestreken.

Oksel/lies (zie algemeen punt 3)

Beide oksels en liezen uitstrijken met dezelfde wattenstok.

Sputum

Indien dit wordt opgegeven: inleveren in steriele container.

Urine

Bij aanwezigheid van een blaaskatheter inleveren in een steriele container.

Wonden en huidlaesies (indien aanwezig)

Wonden waarbij pus aanwezig is, worden zo diep mogelijk uitgestreken met een droge steriele wattenstok.

Droge wonden, eczeem, psoriasis en navelstompjes van neonaten worden eveneens uitgestreken met een droge steriele wattenstok.

Spoedeisend onderzoek

Buiten openingstijden is de dienstdoende arts-microbioloog/analist te bereiken via de receptionist van het Slingeland Ziekenhuis, telefoon (0314) 32 99 11

Lever de gekleurde envelop zo snel mogelijk in bij één van onderstaande inleverpunten:

- uw huisarts (inleveren kan van maandag t/m vrijdag tot 12.00 uur);
- een bloedafname-locatie of Laboratorium Afname (route 48) van het Slingeland ziekenhuis Doetinchem (openingstijden vindt u op www.slingeland.nl/bloedafname).

Bewaar de envelop maximaal 24 uur in de koelkast als direct inleveren niet mogelijk is.