

Informatie over de onderzoeken is te vinden in de digitale laboratoriumgids op de website www.slingeland.nl/labonline

Patiënt BSN: Patiënt-nr.: Naam + voorletters: Geboortedatum + geslacht: m/v Adres: Woonplaats:	Aanvragend arts Naam : Arts code : Adres : Woonplaats : Telefoon/Sein :	Labnummer Niet beschrijven
	Materiaal Aard : Herkomst : Afnamedatum : Afnametijd :	

Klinische gegevens

Zwanger: ☐ nee ☐ ja
 Verblijf buitenland: ☐ nee ☐ ja welk land: van tot
 Antibiotica: ☐ nee ☐ ja welk antibioticum: van tot

Bacteriologie ☐ Banale kweek ☐ Actinomyces ☐ Nocardia ☐ Gardnerella vaginalis ☐ Helicobacter pylori ☐ Screening GBS (z.o.z 1) ☐ Screening MRGN (zoals ESBL) ☐ Screening S. aureus ☐ Verdenking lijnsepsis (kweek tip + bloedkweken) ☐ Verdenking TBC (kweek + auramine preparaat) ☐	Feces (parasitologie) ☐ Niet-reiziger/niet-migrant/immuun-gecompromiteerd ☐ Giardia lamblia PCR ☐ Cryptosporidium species PCR ☐ Reiziger en migrant (S.v.p. verblijf buitenland invullen) ☐ Giardia lamblia PCR ☐ Cryptosporidium species PCR ☐ Entamoeba histolytica PCR ☐ Cysten/Wormeieren ☐ Aanvullend onderzoek ☐ Cyclospora cayentensis PCR ☐ Strongyloides stercoralis PCR (z.o.z 2) ☐ Schistosoma PCR (z.o.z 2) ☐	Moleculaire diagnostiek ☐ Respiratoir (keel/naso (z.o.z 3), sputum, BAL) ☐ PLM (Psittacose, Legionella en Mycoplasma) (z.o.z 5) ☐ Influenza A/B + parainfluenza ☐ RS virus + humaan metapneumovirus (hMPV) ☐ Adenovirus/Enterovirus/Parechovirus ☐ Enterovirus/Parechovirus (keel/naso (z.o.z 3) + feces) ☐ Adenovirus (keel/naso (z.o.z 3), feces, ooguitstrijk) ☐ Cytomegalovirus (urine + keel/naso (z.o.z 3)) ☐ Herpes simplex virus (HSV) /Varicella zoster virus (VZV) (vocht, blaasjes, keel) ☐ Cardio-Myo-Neurotrope virussen ☐ Enterovirus/ Parechovirus (feces) ☐ Influenza A/B + parainfluenza, Enterovirus/Parechovirus en M. pneumoniae (keel/naso (z.o.z 3)) ☐ Bordetella pertussis (Kinkhoest) ☐ M. tuberculosis (TBC)
Mycologie ☐ Gisten (Candida) ☐ Gisten en schimmels ☐ Pneumocystis jiroveci (voorheen carinii) ☐	Sneltesten ☐ Clostridium difficile (feces) ☐ Helicobacter pylori (feces) ☐ Norovirus PCR (feces) ☐ Legionella / Pneumokokken (urine) ☐ RS virus PCR (<8 jaar) (keel/naso z.o.z 3) ☐	Moleculaire diagnostiek in liquor: ☐ Herpes simplex virus (HSV) /Varicella zoster virus (VZV) ☐ Enterovirus/Parechovirus
Feces ☐ Bacterieel PCR ☐ Salmonella ☐ Shigella ☐ Campylobacter ☐ Yersinia PCR ☐ STEC PCR (Shiga-toxine vormende E. coli) ☐ Virale gastro-enteritis PCR (Rota-/Adeno-/Astro-/Sapo-/Norovirus) ☐	SOA ☐ C. trachomatis / N. gonorrhoeae PCR (z.o.z 4) ☐ M. genitalium PCR (z.o.z 4) ☐ T. vaginalis PCR (z.o.z 4) ☐ Herpes simplex virus (HSV) /Varicella zoster virus (VZV) PCR (z.o.z 4) ☐ Syphilis/Lues PCR (z.o.z 4) ☐	Ander onderzoek ☐ Malaria ☐ Scabiës PCR ☐

Spoedeisend onderzoek

Buiten openingstijden is de dienstdoende arts-microbioloog/analist te bereikbaar via de receptionist van het Slingeland Ziekenhuis, telefoon (0314) 32 99 11.

Lever de gekleurde envelop zo snel mogelijk in bij één van onderstaande inleverpunten:

- uw huisarts (inleveren kan van maandag t/m vrijdag tot 12.00 uur);
- een bloedafname-locatie of Laboratorium Afnamede (route 48) van het Slingeland ziekenhuis Doetinchem (openingstijden vindt u op www.slingeland.nl/bloedafname).

Bewaar de envelop maximaal 24 uur in de koelkast als direct inleveren niet mogelijk is.

Nader gebruik lichaamsmateriaal

Lichaamsmateriaal wordt afgenomen voor diagnostische en therapeutische doeleinden.

Lichaamsmateriaal dat na analyse overblijft kan voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden.

Dit gebeurt op anonieme wijze, d.w.z. dat er niet meer kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is.

Indien er van uw kant bezwaren zijn tegen nader gebruik van uw lichaamsmateriaal, dan kunt u dit melden.

De etiketten op de afnamebuizen worden dan voorzien van de tekst: Niet voor andere doeleinden gebruiken.

Bezwaar hoeft maar één keer gemaakt te worden. Bij alle volgende aanvragen komt de tekst automatisch op de etiketten.

Opmerkingen

1. Recto-vaginaal uitstrijk in ESwab met roze dop insturen.
2. Bij verdenking op infectie met Strongyloïdes en/of Schistosoma is serologie aan te bevelen.
Ter ondersteuning kan feces-onderzoek verricht worden. Hiervoor op 3 aaneensluitende dagen een potje verse feces (<24 uur oud) inzenden, het potje tot driekwart vullen.
3. Nasofarynx-uitstrijk in ESwab met oranje dop insturen. Deze is te verkrijgen bij het MML in SZ.
4. Voor een combinatie aanvraag op SOA diagnostiek en een bacteriologische kweek dienen twee roze ESwabs ingestuurd te worden.
NB: M. genitalium/T. vaginalis alleen mogelijk op urine of genitaal uitstrijk.
NB: Syphilis/Lues alleen mogelijk op uitstrijk van een ulcus.
5. Voor aantonen Legionella is uitsluitend materiaal uit de lagere luchtwegen geschikt, diep uitgezogen sputum en BAL.